



Pruebas que requieren condiciones especiales

 Vigilado Supersalud

Clínica **Imbanaco**
Grupo  quirónsalud

Laboratorio
Clínico

Cortisol en saliva

Siga las indicaciones médicas, si le han suministrado algún medicamento, hágalo saber al personal del laboratorio.

- La toma de la muestra a las 11:00 p.m. solo se realiza en la Sede Principal.
- No utilice labial.
- No se cepille los dientes dos horas antes de la toma del examen.
- No ingiera alimentos 1 hora antes de la toma del examen.
- Llegar 30 minutos antes de la toma.

Esta muestra solo se toma en la Sede Principal.

Curvas de glicemia o insulina, glicemia pre y post y test de O'sullivan

Para la realización de estos exámenes, usted debe disponer del tiempo suficiente para estar en reposo en el laboratorio (hasta 3 horas).

- Debe estar completamente en ayunas el día de la toma de la muestra.
- El día anterior debe ingerir una comida normal, aproximadamente entre las 6:00 p.m. y 9:00 p.m. Al día siguiente presentarse en el laboratorio entre las 6:00 a.m. y 9:00 a.m., teniendo en cuenta que debe cumplir con un ayuno de 8 a 12 horas.
- Después de consumir la carga de glucosa o el desayuno, permanezca en reposo total dentro del servicio hasta finalizar el examen.

Estas muestras puede ser tomadas en la sede Torre B, Sede Principal, Sede Pacific Mall y Sede Ciudad Jardín.

Depuración de creatinina

Debe presentarse en el laboratorio con una muestra de orina de 24 horas (Ver instrucciones para toma de muestras de orina de 24 horas). Tenga en cuenta que el examen incluye la toma de una muestra de sangre, que debe hacerse el mismo día que lleve la de orina.

Esta muestra puede ser tomada en cualquiera de nuestros centros diagnósticos.

Antígeno prostático específico total y libre

La muestra se debe tomar antes de la realización de biopsias prostáticas o prostatectomía. De lo contrario, debe dejar pasar 10 días para la toma de la muestra de sangre.

- Es necesario que tenga abstinencia sexual de mínimo 24 horas.
- No tacto rectal.
- No masaje prostático.
- No montar a caballo.
- No montar bicicleta.
- No ejercicio excesivo.

Esta muestra puede ser tomada en cualquiera de nuestros centros diagnósticos.

Prolactina o pool de prolactina

La toma de la muestra se realizará entre 2 y 4 horas después de haberse levantado y máximo hasta las 10:00 a.m.

Si el examen solicitado es pool de prolactina, debe disponer mínimo de 1 hora para permanecer en el laboratorio.

Cuidados antes de la toma de la muestra:

- Evite tomarse la muestra después de periodos de trasnocho, si ha tenido relaciones sexuales o manipulación de los senos (Incluye autoexamen), espere 48 horas.
- Si ha realizado ejercicio, espere 24 horas.
- Si se ha lesionado el pecho, espere una semana.
- Informar al personal de laboratorio si está tomando medicamentos, tranquilizantes, antidepresivos para la hipertensión, anticonceptivos, ranitidina, plasil o medicamentos para malestares gastrointestinales.
- No fume antes, ni durante la toma de la muestra.

Esta muestra puede ser tomada en cualquiera de nuestros centros diagnósticos.

Muestras especiales como la de los factores de coagulación solo se toman en la Sede Principal.

Clínica Imbanaco

Grupo  quiroñsalud



Máximo Estándar
Nacional de la Calidad
en Salud



Máximo Reconocimiento
de la Asociación en
Salud en Colombia



Acreditación para el
Laboratorio Clínico y Laboratorio
de Patología Anatómica



Acreditación para
Laboratorio por el Ministerio
Europeo de Higiene y Salud



Trofeo
Nacional Hospital
Seguro 2019



Trofeo
Seguro Hospital
de la Categoría 2019

Ubica nuestros puntos de atención

- Sede Principal: Carrera 38 Bis No. 5B2 - 04 Piso 4 • Centro Médico Torre B: Carrera 38A No. 5A - 109 Piso 1 • Centro Diagnóstico Ciudad Jardín: Calle 15A No. 103 - 15 • Centro Diagnóstico C.C. Pacific Center: Calle 36N No. 6A - 65 Piso 7 • Programa tu servicio de toma de muestras de laboratorio a domicilio: Línea WhatsApp: +57 310 6036029
- Conmutadores: (602) 5186000, 3821000, 3851000
- Cali • Colombia • www.imbanaco.com